

USLUGE Zavoda za Javno zdravlje - klinička mikrobiologija		
Vrsta ispitivanja/uzorka	vrsta analize	metoda ispitivanja
Bris ždrela	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris usne duplje/usne	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris jezika	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris bukalne sluznice/desni	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris kože, kože dojke	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris rane	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris uha	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris konjunktive (oka)	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris vagine	bakteriološki, mikološki, parazitološki, bakterijska vaginoza	izolacija/detekcija
Bris cerviksa/cervikovaginalni bris	bakteriološki, mikološki, testovi na: hlamidije, mikoplazme, ureaplazme	izolacija/detekcija
Bris vulve	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris lohija	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris uretre	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Perianalni bris	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
sperma/ekspimat prostate	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Sekret dojke	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris glansa, prepucijuma	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Urinokultura	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Koprokultura	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Rektalni bris	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Sputum/trahealni aspirat	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Ekskreći (mleko i dr.)	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris traheostome/kanile	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris pupka	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
Bris nosa	bakteriološki, mikološki	izolacija/detekcija
ASO /iz krvi	serološka	latex
CRP /iz krvi	serološka	latex
RF /iz krvi	serološka	latex
HIV-(Ag+At)/iz krvi	serološka	ELFA
HBs antigen/iz krvi	serološka	ELFA
HCV At/iz krvi	serološka	ELFA
Test na Mycoplasma hominis i Ureaplasma species sa antibiogramom (cervikovaginalni bris, bris uretre, sperma)	bakteriološka	detekcija/izolacija
TPHA/iz krvi	serološka	mikrohemaglutinacija
Test na Ag Chlamidia spp. (bris cerviksa, bris uretre, urin)		IH
Ag Helicobacter pylori u stolici		IH
Test na toksin A i B Clostridium difficile u stolici		IH

Rubella virus IgM At/iz krvi	serološka	ELFA
Rubella virus IgG At/iz krvi	serološka	ELFA
Toxoplasma gondii IgM At/iz krvi	serološka	ELFA
Toxoplasma gondii IgG At/iz krvi	serološka	ELFA
At na H. pylori/ iz krvi	serološka	ELFA
At na Brucella spp. /iz krvi	serološka	mikroaglutinacija/latex
At na EBV/iz krvi	serološka	mikroaglutinacija/latex
Vidal- ova reakcija (At na salmonela vrste)/iz krvi	serološka	mikroaglutinacija/latex
Stolica na parazite(helminti,protozoae)	parazitološka	morfološki
Perianalni otisak	parazitološka	morfološki
Otisak kože(lica i dr.)	Demodex vrste	morfološki
Strugotina kože/nokta dlaka	mikološka	morfološki/izolacija/detekcija

Legenda:

ASO-antistreptolizin O antigen
 RF-reuma faktor
 CRP-C reaktivni protein
 HBs- S antigen/ hepatitis B
 HCV –antitela na C antigen/hepatitis C
 Ag-antigen
 At-antitela
 TPHA-Treponema palidum hemaglutinacioni test na lues
 IH-imunohromatografska metoda ispitivanja
 ELFA-elizaimunofluorescencija
 EBV-ebštajnbarski virus na inf. mononukleozu

U Centru za mikrobiologiju (klinička mikrobiologija) uzrokuju se materijali pacijenata i primaju doneti uzorci ili uzorci uzorkovani u drugim zdravstvenim ustanovama isključivo uz **uput nadležne zdravstvene ustanove/ doktora medicine/ čitko i kompletno popunjen;**

Uzorke briseva doneti u odgovarajućem broju:

- brisevi guše i nosa: **po 1 bris**
 - svi ostali uzorci briseva: **minimum 2 brisa po uzorku**
- osim za **vaginalni bris** gde su neophodna **3 brisa** ukoliko se traži i parazitološka analiza; **i 4 brisa za cervikalni bris**, ukoliko se traže i analize na hlamidije, mikoplazmu i ureaplazmu.
- telesne tečnosti je dovoljno doneti u manjoj količini: **minimum 1 ml**
 - stolicu, u manjoj količini sa mesta izmenjene stolice: **minimum veličine graška.**

Napomena: nije neophodno napuniti posude za uzorkovanje urinom i fecesom, dovoljna je mala količina, gore navedena